

便秘治療薬 チルゴン錠S

第2類医薬品

便秘の多くは、腸管の運動、特に蠕動運動が低下したときにおこります。

チルゴン錠Sは、結腸粘膜に直接作用する接触性下剤のビサコジル、植物性便通剤のダイオウ、カンゾウの配合により、その活動を亢進させ、軟い、苦痛のない排便を促します。

使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は次の医薬品を服用しないで下さい
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい
3. 大量に服用しないで下さい



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。 はげしい腹痛、恶心・嘔吐
- (6) 1ヶ月以上連続して服用する場合。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談して下さい

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、恶心・嘔吐

- (2) 5~6日服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談して下さい
下痢

〔適応症〕

便秘 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、腸内異常発酵、腹部膨満、食欲不振、のぼせ、肌荒れ、吹出物、痔

〔用法・用量〕

15才以上 3~4錠宛 1日1回就寝前（又は空腹時）に服用すること。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しづつ增量又は減量して下さい。

<用法・用量に関連する注意>

1. 定められた用法・用量を厳守して下さい。
2. 小児に服用させないで下さい。
3. 体の衰弱している人。
4. 月経時の人。

〔成分・分量〕 1日量（4錠中）

ビサコジル(4-4'-ジアセトキシジフェニル-ピリジル-2-メタン) 12mg
 大黄エキス(原生葉換算量 1.15g) 320mg
 カンゾウ粗エキス(原生葉換算量 0.68g) 136mg
 添加物として、ステアリン酸Mg、タルク、セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート、酸化チタン、炭酸Ca、リン酸水素Ca、アラビアゴム、ゼラチン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、白糖、カルナウバロウを含有する。

<成分に関連する注意>

ダイオウ（大黄）により、尿が橙色ないし赤色を帯びることがあります、心配ありません。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- 1) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 2) 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 3) 誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないで下さい。
- 4) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているP.T.Pシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思ひぬ事故につながります。）



販売元 株式会社ラピー

大阪府東大阪市本庄東2丁目6番21号

お問い合わせ先 製品内容についてのお問い合わせは、下記の製造元にお願い申しあげます。
 東邦薬品工業株式会社 奈良県橿原市繩手町字久保カイト214-1
 TELO744-22-2561 受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 東邦薬品工業株式会社 奈良県橿原市繩手町字久保カイト214-1